

Zu diesem Produkt gibt es keine medizinisch belegten Nebenwirkungen. Bei eventuellen Nebenwirkungen den Gebrauch abbrechen und den Hersteller kontaktieren (die Kontaktdaten sind am Ende dieses Informationsblattes zu finden). Falls notwendig einen Arzt hinzuziehen. Bei Verschlucken des E Liquids kontaktieren Sie den Berliner Giftnotruf in Deutschland, rund um die Uhr erreichbar unter: +49 (0)30-19 240 - in Österreich den 24-Stunden Notruf der Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1-406 43 43. Bitte beachten Sie die Gegenanzeigen.

Beim Gebrauch von E-Zigaretten ist der Nutzer nur einem Bruchteil von mit Tabakkonsum verbundenen Giftstoffen ausgesetzt (siehe toxikologische Angaben). Im Gegensatz zum Tabakrauch sind im Dampf einer E-Zigarette weder Teer noch Kohlenmonoxid enthalten. Nichtsdestotrotz enthalten E-Liquids mit Nikotin entsprechende Giftstoffe und sind mit Vorsicht zu genießen.

Reines Nikotin ist ein giftiger und hochpotenter Suchtstoff, der durch Einatmen, Verschlucken und Hautkontakt aufgenommen wird. Der Schätzwert Akuter Toxizität (ATE- Acute Toxicity Estimates) durch den oralen Expositionsweg für Nikotin liegt bei 5 mg/kg. Der ATE durch den dermalen Expositionsweg (Hautkontakt) liegt bei 70 mg/kg, der für das Einatmen von Nikotin liegt bei 0,19 mg/L. Nikotin kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen und zu Kopf- und/oder Bauchschmerzen sowie Schwindelgefühl und Übelkeit führen.



Bedeutung des Symbols, durchgestrichene Mülltonne' - Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer

durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

VL
TZ
flex pro
POD



E-Liquid hergestellt im Vereinigten Königreich von Pillbox38 (UK) Ltd, Stancliffe Street, Blackburn, BB2 2QR.

Importeur
Totally Wicked E-Liquid (Europe) GmbH,
Siemensstrasse 7, 93055 Regensburg, Germany
Telefon +49(0)941-78447082,
E-mail: info@totallywicked.de



TOTALLY  WICKED

VL
TZ
flex pro
POD



GEBRAUCHSINFORMATION



**VL
TZ**
flex pro
POD



Wichtig!

Bitte lesen Sie vor Nutzung des Produktes dieses Informationsblatt vollständig durch!

Gebrauch

1. Entfernen Sie die Silikonkappe von der Oberseite des Mundstücks und den Silikoneinsatz auf der Unterseite des Pods.
2. Setzen Sie den Pod in den VLTZ Flex Pro Akku ein und ziehen Sie vorsichtig am Mundstück, um Dampf zu erzeugen.
HINWEIS: Ein leicht verbrannter Geschmack oder Geschmacksverlust weisen darauf hin, dass das E-Liquid im VLTZ Flex Pro Pod aufgebraucht wurde. Setzen Sie für eine weitere Nutzung einen neuen VLTZ Flex Pro Pod ein.

Aufbewahrung

- Dieses Produkt sowie das Zubehör bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern/Jugendlichen und Tieren aufbewahren.
- Die VLTZ Flex Pro Pods sind bereits vorgefüllt und nicht zur Nachfüllung geeignet.
- Zwischen 2°C und 25°C an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

- Versuchen Sie nicht einen fehlerhaften VLTZ Flex Pro Pod zu reparieren oder zu öffnen - es handelt sich um eine versiegelte Einheit ohne zu wartende Teile.

Gegenanzeigen

Das Produkt sollte nicht verwendet werden von:

- Kinder und Jugendliche.
- Schwangere oder stillende Frauen, die nicht zuvor einen Arzt zurate gezogen haben.
- Menschen mit Atemungsstörungen oder Allergien in Bezug auf Produktbestandteile, solange sie nicht zuvor einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft zurate gezogen haben.

Warnung

Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Dieses Produkt ist nicht zu empfehlen für Nichtraucher. Die Abgabe an Jugendliche oder Kinder ist verboten! Der Verkauf an Minderjährige ist untersagt. Das Produkt außer Reichweite von Minderjährigen aufbewahren.

Toxikologische Angaben: Potentiell gesundheitsschädliche Substanzen

	100 Züge bei 55 ml Zugvolumen, 3 S. Dauer in 30 S. Intervallen bei der Totally Wicked VLTZ Flex Pro (16mg/ml) ¹	Tabak Zigarette 10-13 Züge bei 55 ml Zugvolumen, 2 S. Dauer in 30 S. Intervallen. ²
Formaldehyd	<8,00 µg- unter Nachweisgrenze	79 µg
Acetaldehyd	<16,00 µg- unter Nachweisgrenze	1705 µg
Akrolein	<8,00 µg- unter Nachweisgrenze	138 µg

	100 Züge bei 55 ml Zugvolumen, 3 S. Dauer in 30 S. Intervallen bei der Totally Wicked VLTZ Flex Pro (16mg/ml) ¹
Blei	<0,20 µg- unter Nachweisgrenze
Cadmium	<0,20 µg- unter Nachweisgrenze
Arsen	<0,20 µg- unter Nachweisgrenze
Nickel	1,17 µg/200 Züge
Chromium	0,88 µg/200 Züge

¹ Untersuchungsmethode basiert auf CORESTA Nr. 74.
² Chemical Research in Toxicology 2016 29(1), 125-131.